## IDENTIFICADORES CLAVES



Las hojas son azules y verdes con una savia blanca y lechosa.

Las flores son amarillas con brácteas de color verde pálido.

Flor

Bráctea



Produce muchas flores en cada tallo. Las plantas diseminan sus semillas hasta 15 pies.

Semillas

# REALIDADES ACERCA DEL TÁRTAGO/ EUFORBIA MIRTO

- Tártago/Euforbia Mirto (Euphorbia myrsinites) también es conocido como Cola de Burro, Azul, o Tártago rastrero.
- Todas las partes de la planta contienen una savia blanca-lechosa venenosa que puede causar irritaciones muy graves de la piel.



- Las plantas se reproducen por semilla y por fragmentos de raíz.
- Tártago Mirto está superando las communidades de las plantas nativas en nuestras cañones locales.
- Tártago Mirto está en la lista de plantas invasivas del Condado de Salt Lake. Por eso, es ilegal venderlo en el condado de Salt Lake. Muchos viveros fuera de Salt Lake han decidido no venderlo.
- Tártago Mirto puede dar la apariencia de ser beneficiosa porque es muy tolerante a la sequía y muy fácil para cuidar; sin embargo, hay mejores alternativas que son menos dañinas a nuestra ecología.



### PLANTAS ALTERNATIVAS

### PLANTAS ALTERNATIVAS

Tártago
Mirto es
conocido
por los
jardineros
por sus
flores raras
y su
abilidad de



sobrevivir en areas marginals. Sin embargo, por causa de su **savia venenosa y natura- leza invasiva**, muchos jardineros conscientes del problema la están eliminando.

Buenas alternativas para el tártago mirto incluyen plantas perennes con **tolerancia a** la sequía, nativas de Utah, y otras ornamentals que usualmente atraen insectos beneficiosos y fauna silvestre. Algunas incluyen:

#### Planta; xerofítica; nativa; de Utah:

- Sulphur flower *Erigonum umbellatum*
- Sundance Daisy Hymenoxys acaulis
- Fragrant evening primrose Oenothera caespitosa
- Desert Four-oclock Mirabilis multiflora

#### **Otras nativas ornamentale:**

- Penstemon Penstemon sp.
- Sedums (such as Hen & Chicks)
- Heterotheca villosa

## ¿RECONOCE ESTA PLANTA?

## DÓNDE OBTENER INFORMACIÓN

## OPCIONES DE MANEJO



Foto: Patrick Nelson, BCWMA

### TÁRTAGO/EUFORBIA MIRTO

es una planta xerófita, nociva y usada como una planta ornamental, siendo muy popular en los jardines desérticos y de piedra. Esta maleza exótica es un peligro para las plantas en nuestras laderas, para los bosques y para la salud pública.

### Condado de Salt Lake

Sage Fitch Número para el control de maleza: **385-468-4035** 


Email: noxiou;weed;@\$lco.org
Sitio web: www.\$lco.org/weed;/





Fotos: Tony Frates LINIPS

Esta publicación fue creada por la organización Bonneville CWMA con fondos proporcionados por el Servicio Forestal de los EE.UU. y los de la Asociación de Supervisores de Malezas de Utah.



**euforbia.** Use guantes, camisa de manga larga, y protección para los ojos.

#### **Control Manual**

- Con azada manual para áreas pequeñas.
   Excavar por lo menos 4 pulgadas de profundidad para sacar la raíz.
- Tire plantas a la basura; no lo use para la compostera porque se puede diseminar.

### **Control Químico**

- Aplique los herbicidas 2,4-D o glifosato (marcas registradas en Weed-B-Gon o Roundup). Para mejores resultados, aplique el herbicida en el otoño.
- Tenga precaución al aplicar herbicidas y siempre consulte la etiqueta de información.

Cualquier método que usa, manual o químico, sea consistente por varios años para tener éxito.



Fotos: Tony Frates, UNPS

